



Kui patsiendile on esmaabi näidustatud, siis:

- riided nagisse (eraldi igal patsiendil);
- jalatsikaitsed (kilesussid);
- kätepesu ja desinfitseerimine (vähemalt 30 sekundit);
- patsient juhatatakse vastuvõtu kabinetti. Patsiendi liikumisala on kliinikus märgistusega piiratud, tualette ei kasutata;
- triiaži õel/töötajal on mask ees, kindad käes, peale igat patsienti kätepesu ja desinfektsioon.

3. Isikukaitsevahendid

- Arst ja assistent töötavad FFP3 või FFP2 respiraatoriga, kaitseprillide ja visiiriga.
- Iga patsiendi järel uus pikkade varrukatega pritsmekindel kaitseülikond või kittel, peakate, kilesussid, respiraator, desinfitseeritud visiir ja kaitseprillid.
 - Kui respiraatorite varu on väike ja patsiente rohkem, siis võib kasutada ühte respiraatorit kuni 2 tunni vältel eeldusel, et seda vahepeal eest ära ei võeta.
 - Kui respiraator muutub niiskeks, tuleb seda kohe vahetada!
- Steriliseerija töötab maski ja kinnastega.
- Administraator töötab maski ja kinnastega või kaitsva barjäärklaasi taga. Barjäärklaasi puudumisel võib kasutada tugevat maalrikilet.

4. Protseduurid

- Ravile võetakse esmaabi patsiente.
- Kõigil protseduuridel, kus võimalik, kasutatakse kofferdami ja välditakse vesijahutust, ultraheli ja/või suruõhku vajavate instrumentide kasutamist.

5. Kabineti desinfitseerimine (30 min)

- Iga patsiendi järel peab jääma vähemalt 20 minutit kabineti puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.
- Võimalusel tuulutada kabinetti, kasutada HEPA filtriga õhupuhastit või UV lampi.

6. Instrumendid

- Kasutatud otsikute autoklaavimine toimub iga patsiendi järel.
- Otsikud ei ole tooli küljes vaid steriilselt pakendatud.

7. Arveldamine

- Makseterminal puhastatakse iga kasutuse järgselt.
- Võimalusel vältida sularahamakset.
- Pärast igat patsienti kätepesu, desinfektsioon ja administraatori leti puhastamine.