

**Lisa 2. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamise miinimum põhimõtted COVID-19 positiivse või nakkusohtliku patsiendi käsitlemisel**

IKV	Lähikontakt COVID-19 kahtlusega patsiendiga	AGP teostamine COVID-19 kahtlusega või kinnitunud juhtudel sh hambaravi	Laboratoorselt kinnitatud COVID -19 patsientide ravitegevus
Pritsmekindel kaitsekittel <sup>1</sup>	+/-	+	+
Kilepõll <sup>2</sup>	+/-	-	+
Kätised <sup>2</sup>	-	-	+
Kindad <sup>2</sup>	+	+	+
FFP2 respiraator <sup>3,4</sup> koos kaitseprillidega VÕI kirurgiline mask koos visiiriga	+	-	+
FFP3 respiraator <sup>3,4</sup> koos kaitseprillidega/visiir	-	+	AGP

<sup>1</sup>pritsmekindla kitli puudumisel tuleb kasutada ühekordset kilepõlle tavalise kaitsekitli peal.

<sup>2</sup>COVID-üksustes vahetatakse patsiendiga kontakti järgselt kilepõll, kindad ja kätised. Respiraator, kaitsekittel jäävad samaks osakonnast lahkumiseni.

<sup>3</sup>FFP3 respiraatori puudumisel kasutada FFP2 respiraatorit. Respiraatorite puudumisel kasutada kirurgilist maski koos visiiriga.

<sup>4</sup>Kaitseprillid/visiirid desinfitseeritakse. Muud kasutusel olevad isikukaitsevahendid on ühekordseks kasutamiseks.